

가렵고 민감한 두피엔 액

일반의약품

의약품 분류번호	264 진통, 진압, 수렴, 소염제
-------------	------------------------

【원료약품의 분량】 이 약 100mL 중

유효성분

프레드니솔론발레로아세테이트(KP)	0.15g
L-멘톨(USP)	3.5g
티몰(KP)	0.15g
크로타미톤(USP)	5.0g
에녹솔론(BP)	1.0g
알란토인(USP)	0.2g

기타첨가제

라우로마크로콜, 부틸렌글리콜, 에탄올, 정제수, 히드록시프로필메틸셀룰로오스, 히알루론산나트륨

【성상】

무색 투명한 액제

【효능·효과】

가려움, 피부염, 습진, 땀띠, 두드러기, 벌레물린데

【용법·용량】

1일 수회(여러 차례) 질환 부위에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 및 신체부위에는 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 수두, 무좀·백선 등 또는 화농(끓음)이 있는 질환 부위
- 2) 눈 또는 눈주위, 점막 등
- 3) 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 사람

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 이 약을 얼굴에 사용할 때에는 광범위하게 사용하지 않는다.
- 2) 장기 사용하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적, 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 습윤이나 짓무름, 염증이 심한 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람 및 수유부
- 5) 질환 부위가 넓은 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것

- 1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 사용을 중지한다.

관련 부위	증상
피부	발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 염증, 건조감, 자극감, 열감, 따끔거림
피부(질환 부위)	무좀·백선 등의 백선, 여드름, 화농(끓음)증상, 지속적인 자극감

- 2) 5~6일간 사용 후에도 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.

- 3) 빈도불명의 시야흐림이 나타날 수 있다.

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 준수한다.
- 2) 소아에게 사용하는 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용한다.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 않는다.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진료를 받는다.
- 5) 약액이 묻은 손이 눈 등 점막에 닿으면 자극이 있으므로 손에 묻은 약액은 잘 씻는다.
- 6) 이 약은 사용 전에 잘 흔들어 사용해야 한다.
- 7) 이 약을 염색한 머리에 사용하면 탈색될 수 있으므로 주의한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- 4) 불 근처에 두지 않는다.
- 5) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 6) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 이 약 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)

【포장단위】

30mL/병

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통 기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 마개 개봉이 어려울 수 있으니 마개의 하단 부분을 꼭 잡고 개봉 하십시오.

※ 사용중 용기 입구에 보일 수 있는 흰색 결정은 성분에 기인한 것으로 제품의 약효 및 안정성에는 문제가 없습니다.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
3. 잘못된 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2019. 01. 22

제조의뢰자 :

 **한미약품(주)**(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

제조사 :

(주)퍼슨 

충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

**Hanmi Pharm. Co., Ltd.**

14, Winyesong-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-724, Korea
Tel, 02-410-9114 Fax, 02-410-9119

Check List		Color	
File Name	두피엔엑_001		군청
Type(Material)	설명서		
Size(LxWxH/mm)	150X210		
Date(Y/M/D)	2019/01/22		
Version No.	02246001		
Country	대한민국		
표준코드	N/A		
파마코드	0000		
Memo			
신규			