

흡수율을 높인 간기능 개선제

실리만 연질캡슐 140

(밀크시슬엑스)

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 밀크시슬엑스(별규) 175mg(실리빈으로서 60mg)

첨가제(동물유래성분) : 속신산젤라틴(소, 가죽)

기타 첨가제 : 글리신, 농글리세린, 디에틸렌글리콜모노에틸에테르, 리놀레산에틸, 모노올레인산 글리세린, 비타민E(RRR- α -토코페롤), 에리토브산, 에틸바닐린, 중쇄트리글리세리드, 폴리소르베이트20, 폴리옥살50경화피마자유**【성 상】**

갈색의 내용물이 든 투명한 연질캡슐제

【효능·효과】

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

【용법·용량】

성인 : 초기용량 1일 3회, 1회 1캡슐, 유지용량 1일 2회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부, 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.
 - 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)**【포장단위】** 100캡슐/상자(10캡슐/PTP×10), 1캡슐/포, 100캡슐/상자(1캡슐/포×100)**【제품문의처】** 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원 (14-3330)
 ※ 의약품 부작용 신고 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
 (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

흡수율을 높인 간기능 개선제

실리만 연질캡슐 140

(밀크시슬엑스)

일반의약품

4692

Ver. 02366003

※ 주의

- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛 노출이나 고온 보관은 삼갈 것.
- 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.
- 이 제품은 투명 캡슐로 주성분(생약)의 고유한 특성상 제품의 색상에 다소 차이가 있을 수 있으나 약효와는 무관하므로 안심하고 복용하여도 됨.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
※ 이 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP 포장상태로 보관하십시오. ※

설명서 개정연월일 : 2024. 07. 24

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.