

노원[®] 질좌제 100mg

(노녹시놀9)

【원료약품의 분량】 1좌제 중

유효성분 : 노녹시놀9(USP) 100mg

기타 첨가제 : 경질지방, 락트산, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜4000

【성 상】 흰색의 포탄형 좌제

【효능·효과】 피임

【용법·용량】

성교 10분~1시간 전에 질 깊숙이 좌약 1개를 삽입한다.

이 약 삽입 후 1시간 내에 성교를 하지 못하거나 성교를 반복할 때에는 다시 1개를 삽입한다.

●노원질좌제의 사용요령

1. 플라스틱 포장 윗쪽의 겹쳐진 부분을 그림과 같이 잡아 당기면 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

2. 성교전에 그림과 같이 질 깊숙이 좌약 1개를 삽입합니다.

삽입후에 노원질좌제가 녹을때까지 잠깐(일반적으로 최소 10분 이상) 기다려셔야 합니다. (노원질좌제는 5~10분이면 질내 분비액의 양에 관계없이 체온에 의해 녹게 됩니다.) 성교를 반복할 때에는 시간과 관계없이 본품을 다시 또 1개 삽입 합니다.

3. 노원질좌제는 삽입후 1시간 이상 약효가 지속되므로 필요에 따라 미리 삽입하셔도 좋으나 삽입후 1시간이 넘어서 성교를 갖게 될 경우 보다 확실한 피임을 위하여 다시 1개를 삽입하시는 것이 좋습니다.

●노원질좌제 사용시 참고사항

- * 성교가 끝난 후 목욕 또는 세척할 때는 질주변을 씻어내는 것은 무방하지만, 질내부 세척 (비데 또는 샤워기의 직접 투입사용 등)은 약효의 지속을 방해할 우려가 있으므로 삼가는 것이 좋습니다.
- * 노원질좌제는 삽입후 앉거나, 일어섰을 경우 약액이 흘러나올 수 있으니 주의하여 주십시오.
- * 성교시 체위는 정상체위가 내용액이 흘러나오는 일이 없으므로 노원질좌제의 피임효과를 확실하게 얻기에 가장 적절합니다.
- * 위 준수사항 및 용법을 지키지 않으면 간혹 피임에 실패할 수도 있습니다.
- * 노원질좌제를 용법·용량대로 사용했다라도 삽입하는 깊이, 관계시 체위, 관계직후에 처리 등의 이유로 약액이 제대로 정자에 닿지 않을 경우 피임에 성공하지 않을 수 있습니다.
- * 노원질좌제의 단독사용으로 피임이 완벽하게 되지 않을 수 있으므로 다른 피임방법을 동시에 같이 이용하시는 것이 좋습니다.
- * 노원질좌제사용 후 임신이 된 경우 태아에 대한 부작용 사례는 아직 보고된바 없으나 태아에 대한 안전성이 보장 되어 있지는 않으므로 임신이 된 경우 의사와 상의하시기 바랍니다.
- * 노원질좌제로 피임하다가 임신을 하려고 할 경우 노원질좌제 성분이 완전히 제거된 다음(최소 7일)에 임신을 시도 하시기 바랍니다.
- * 임신가능성이 있을 경우 임신유무를 확인한 후 임신이 아닌 경우 사용하시기 바랍니다.
- * 제품개봉시 좌제표면이 매끄럽지 않아 다칠 위험이 있으니 체온으로(깨끗한 손) 녹여 좌제 표면을 매끄럽게 한 후 사용하시기 바랍니다.



【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 이 약은 HIV/AIDS 또는 다른 성매개성질환(STD)을 방어하지 않으며, 질내 자극을 유발 할 수 있어 감염된 성관계 대상으로부터 HIV/AIDS 감염의 위험성을 증가시킬 수 있다.
 - 본인이나 성관계 대상이 HIV/AIDS에 감염되었다면 이 약을 사용하지 않는다. 본인이나 성관계 대상의 감염여부가 불확실하다면 다른 피임법을 선택하도록 한다.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 알레르기 반응의 병력이 있는 사람
 - 출산 후 6주 이내
 - 생리기간
 - 임부
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 직정(항문)에 사용하지 말 것.
 - 경우로 복용하지 말 것.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 최근에 유산 또는 낙태를 한 사람
 - 임신해서는 안된다고 지적받은 사람
 - 이 약이 제대로 작용할 수 없는 질격막이나 자궁탈과 같은 상태
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 삼삼시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 본인이나 성관계 대상이 작열감, 가려움, 발진 또는 기타 질이나 음경의 자극이 있는 경우
 - 본인이나 성관계 대상이 배뇨곤란이나 배뇨통증이 있는 경우
 - 복통, 발열, 추위, 질 분비물에서 악취가 나는 경우
 - 임신한 경우
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 질용오로만 사용할 것.
 - 이 약 사용 후 질세척은 권장되지 않는다. 질세척이 필요한 경우, 성교 6시간 이후에 한다.

7. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

8. 기타

- 1) 많은 연구를 통해 살정자제 노녹시놀9를 함유하는 제품들이 질 및 직장자극을 유발 시킬 수 있다는 안전성 사안에 대해 관심이 높아졌다. 때때로 이러한 자극은 증상이 나타나지 않으며, 감염된 성관계 대상으로부터 HIV/AIDS 감염의 위험성을 증가시킬 수 있다.
- 2) 본인이나 HIV/AIDS에 감염되지 않았으며, 성관계 대상이 HIV 위험요인이 없는 일정한 1명인 경우, 여성용 콘돔이나 남성용 콘돔의 사용유무에 관계없이 노녹시놀9를 피임을 위해 사용할 수 있다.
- 3) 본인 또는 성관계 대상이 HIV/AIDS에 감염되었거나 성관계 대상이 여러명인 경우 또는 성관계 대상이 다른 HIV 위험요인을 지니고 있는 경우, 노녹시놀9가 아닌 라텍스 콘돔을 피임을 위해 사용하도록 한다.
- 4) 성관계 시 마다 라텍스 콘돔을 올바르게 사용할 경우, HIV/AIDS 감염 또는 전파의 위험을 크게 줄여줄 수 있지만 그러한 위험이 완전히 사라지는 것은 아니다.
- 5) 최선의 피임법 및 성매개성질환(STD)의 예방법에 대한 더 많은 정보를 원할 경우 의료전문가와 상의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 12개/상자(6개/포일x2)

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 잘못사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
3. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
4. 보관 시 냉장보관하시는 것이 좋으며, 여름철 등 온도가 높아 좌제가 녹는 경우 찬물이나, 냉장고에 넣어 굳힌 후 사용하실 수 있음.
5. 노원 사용중 임신이 될 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.
이 제품은 정상체온에 의해 녹을 수 있도록 만든 좌제로 드물게 체온이 낮은 분의 경우
충분히 녹지 않아 피임이 보장되지 않을 수 있음.

설명서 개정연월일 : 2021. 04. 15

제조의뢰자: **Hanmi** 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14

(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제 조 자: 에이치엘비제약(주) 경기도 남양주시 경강로 27

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr) 의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

노원질좌제_112100176_008

Hanmi

Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서	군청			
Material	모조지(70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	140X240				
Date(Y/M/D)	2021/06/04				
Country	대한민국				

Memo

부작용 피해 신고 및 상담 문구 추가
제조사 수정
성분명 수정
원료약품의 분량 수정
포장단위 수정

※오버프린팅없음!!
※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.