

파워겔

(리도카인)

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분 : 리도카인(KP) 96mg
기타 첨가제 : 디에틸렌글리콜모노에틸에테르, 에탄올(95), 정제수, 카보머 940, 프로필렌글리콜

【성 상】 무색투명의 전질균등한 겔제

【효능·효과】 남성 성기 축각의 예민성 감소

【용법·용량】

성교 5~15분전에 본제(이 약)로서 0.25~0.66그램(리도카인으로서는 23~62mg)을 도포한다(바른다). 용량과 적용 시간은 개인에 따라 다르며 최저유효량을 사용한다. 24시간 이내에 최대 2그램(리도카인으로서는 184mg)을 초과하여 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 본인 또는 상대방이 이 약 또는 기타의 아미드계 국소(부분)마취제에 과민증인 경우
 - 적용 부위에 외상(상처) 또는 염증 환자
 - 상대방이 임신중인 경우
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 간·신질환 환자
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민 하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 일반적 주의
 - 본인 또는 상대방에 발진 또는 자극이 나타나는 경우에는 이 약의 사용을 중지하고 증상이 계속되는 경우에는 의사와 상담한다.
 - 의사의 감독을 받지 않고 3개월 이상 이 약을 사용하지 않는다.
- 적용상의 주의
 - 외용으로만 사용하며 눈 또는 코에 사용하지 않는다.
 - 동일한 부위에 연속해서 도포하지(바르지) 않는 것이 바람직하다.
- 보관 및 취급상의 주의사항

유·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 5포/상자(1g/포×5)


【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※이렇게 파워 겔을 사용하세요

- 성교하기 5~15분전에 파워겔 1포를 찢어 필요한 양을 손가락에 찢 뒤, 음경에 흡수가 잘 되도록 골고루 문질러 바릅니다. 파워겔 1포(1g)는 사용하기 편리하게 1회용 분량으로 포장되었지만 개인에 따라서 최적사용량에 차이가 있을 수 있으므로, 마취효과가 크다고 생각되는 분은 양을 줄여서 사용하십시오.
- 조루증이 그렇게 심하지 않은 분은 그림에서 보는 바와 같이 A부분에만 바르면 됩니다. 조루증이 심한 분은 요도를 제외한 귀두 전체에 바르십시오. 파워겔을 바른 후, 충분히 마사지를 해주면 흡수가 잘되어 효과가 더욱 좋습니다.
- 파워겔은 흡수력이 좋고 끈적이지 않기 때문에 바른 후, 특별히 세척하지 않아도 무관합니다. 하지만 파트너의 성감을 높이기 위해서 바르고 난 5~10분 뒤(귀두의 예민도가 감소되었다고 느끼시면 그 전이라도 상관없습니다)에 물로 씻어내는 것이 좋습니다.



※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시
사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환
또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

4643

Ver. 00139010

※ 주의

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
3. 잘못사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
4. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
5. 피부가 특히 민감한 경우 표피박리 등의 피부질환이 생길 수 있음.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
* 휴대 시 압을 가하거나 누르면 포장에 터져 내용물이 빠질 수 있으니 주의하시고,
사용 시 뜨거운 물을 사용하면 안되며, 30℃ 이하 미지근한 물로 세척하십시오. *

설명서 개정연월일 : 2024. 03. 14

제조의뢰자:

Hanmi **한미약품(주)**

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조사: (주)제뉴원사이언스
세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)
의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.