

설멠추정

【원료약품의 분량】1정 중

유효성분 : 베르베린탄닌산염(JP) 50.0mg
스코폴리아 엑스3배산(별규) 15.0mg(스코폴리아엑스로서 5.0mg)
우르소데옥시콜산(KP) 2.0mg
비스무트차질산염(USP) 120.0mg
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스 · 만니톨복합흡착물, 수크랄로스, 스테비올배당체, 스테아르산
마그네슘, 조합향료(청사과향분말(22506816G)), 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, L-멘톨

【성 상】

노란색의 씹어먹는 원형 정제

【효능 · 효과】

설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법 · 용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1회 2정, 1일 3회 복용
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 2정, 1일 2회 복용
만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1정, 1일 3회 복용
만 5세 이상 ~ 만 8세 미만 : 1회 1정, 1일 2회 복용
만 3세 이상 ~ 만 5세 미만 : 1회 1/2정, 1일 3회 복용
복용간격을 4시간 이상으로 하며, 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
위장진통 · 진경제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
3) 위 · 십이지장궤양 등이 있는 환자
4) 어린이
5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
3) 여러 차례 간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것
3) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로, 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의한다.
4) 복용 시에는 음주하지 말 것
5) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

12정/상자(12정/PTPX1)

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

- ※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)
- ※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 삼키지 말고 충분히 씹어서 복용하시고, 이가 약하신 분은 씹지 말고 입안에서 녹여서 복용하십시오.
2. 복용 시 보철 등 치과치료를 받은 부위에 손상이 일어날 가능성이 있으니 주의하십시오.
3. 복용 후 추정 일부가 치아에 장시간 남아 있을 경우 충치 발생 가능성이 있습니다.
4. 드물게, 포장을 개봉하여 복용 시 추정에 포장물이 붙어 있는 경우가 있으니, 포장 개봉 후 추정 표면에 포장물이 있는지 반드시 확인하시고 복용하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2026. 02. 27

Hanmi **한미약품(주)**

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

설명추정_112102552_001



Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서		군청		
Material	모조지(70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	120X260				
Date(Y/M/D)	2026/03/04				
Country	대한민국				

Memo					
신규		※오버프린팅없음!! ※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다. 인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.			