

뿌리는 무좀약

일반의약품

무조날[®] 외용액 1%

(테르비나핀염산염)

【원료약품의 분량】 100g 중

유효성분 : 테르비나핀염산염(EP)..... 1g
기타 첨가제 : 에탄올(95), 정제수, 토크페롤폴리에틸렌글리콜숙시네이트

【성상】

무색 혹은 옅은 황색의 맑은 액체

【효능·효과】

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴(넓적다리)부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur) 에 의한 어루러기

【용법·용량】

적응증에 따라 1일 1회 또는 2회 적용한다. 적용 전에 환부(질환 부위)를 깨끗이 씻고, 완전히 건조시킨 후 환부(질환 부위)와 그 주위가 충분히 적셔지도록 충분한 양을 바른다.

피부가 겹치는 부위의 감염(유방 밑, 손·발가락 사이, 둔부(엉덩이, 볼기) 사이, 서혜부)의 경우, 특히 아간에는 거즈를 덮어 사용할 수도 있다.

치료기간 :

1. 족부백선(발백선증, 무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선 : 1일 1회, 1주
2. 어루러기 : 1일 2회, 1주

증상의 경감은 보통 2~3일 이내에 나타난다. 감염 재발을 방지하려면 이 약으로 적정기간 동안 정기적으로 치료한다. 치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

• 디바이스 조작법



스프레이 작동 시
정방향으로 세워
한번에 끝까지 꼭
눌러서 사용하십시오.



스프레이를 비스듬히
사용하지 마십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부
이 약의 동물 실험에서 기형 유발 또는 배태자 독성의 가능성은 나타나지 않았다. 사람에게서 기형이 보고된 사례는 없다. 임신한 여성에 대한 임상 경험이 제한적이다.
- 2) 수유부
테르비나핀은 모유 중에 분비되므로, 수유하는 동안 이 약을 사용해서는 안된다. 또한 신생아 및 영아는 가슴을 포함하여 어떤 치료 부위와도 접촉해서는 안된다.
- 3) 수태능
동물 실험에서 테르비나핀의 수태능에 대한 영향은 없었다.
- 4) 소아
소아에 대해 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 이 약을 소아에 투여하지 않는다.(소아에 대한 사용경험이 적다).
- 5) 노인
노인 환자에게 다른 용량이 요구되거나 젊은 환자와 다른 이상반응 경험에 대한 증거는 없다.
- 6) 알코올이 자극할 수 있는 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 환자에게 사용 시 주의해야 한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 가려움, 피부박리(벗겨짐), 적용부위 통증, 적용부위 자극감, 색소침착이상, 피부 화끈감, 홍반(붉은반점), 딱지 등과 같은 국소적 증상이 적용부위에 일어날 수 있다. 이러한 가벼운 증상들은 산발적 사례로 보고되고 치료 중단이 필요한 발진을 포함하는 과민반응과 구분되어야 한다. 우연히 눈에 들어간 경우 테르비나핀염산염은 눈을 자극할 수 있다. 드물게 진균(곰팡이) 감염이 악화될 수도 있다.
- 3) 이상 반응
아래에 이상반응 목록은 기관계 분류와 빈도를 기준으로 한다.
빈도 : 매우 흔하게($\geq 1/10$), 흔하게 ($\geq 1/100$, $< 1/10$), 흔하지 않게($\geq 1/1,000$, $< 1/100$), 드물게($\geq 1/10,000$, $< 1/1,000$), 매우 드물게($< 1/10,000$), 빈도 불명(이용 가능 자료에서 평가 불가). 각 빈도 그룹 내에서, 이상반응은 심각성이 감소하는 순서로 기술되어 있다.

- 가. 면역계 장애
빈도 불명: 과민반응*
- 나. 눈 장애
드물게: 눈 자극
- 다. 피부 및 피하(피부밑) 조직 장애
흔하게: 피부박리(벗겨짐), 가려움
흔하지 않게: 피부 병변(병에 의한 몸의 변화), 딱지, 피부질환, 색소침착이상, 홍반(붉은반점), 피부 화끈감, 두드러기
드물게: 피부 건조, 접촉 피부염, 습진
빈도 불명: 발진*
- 라. 전신장애 및 적용부위 상태
흔하지 않게: 통증, 적용부위 통증, 적용부위 자극감
드물게: 상태 악화
- *시판 후 조사에 근거함.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 얼굴에 사용하지 않는다.
- 2) 이 약은 외용으로만 적용한다.
- 3) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 않는다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
- 4) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 않는다.
- 5) 자극을 일으킬 수 있으므로 균열(갈라짐), 미란(긁자름) 부위에는 주의하여 사용한다.
- 6) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
- 7) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 전균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.
- 8) 에탄올 등의 알코올성 기제가 국소자극을 일으킬 수 있으므로 점막부위에 이 약 투여 시 주의한다.
- 9) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 10) 흡입하지 않는다. 실수로 흡입하여 증상이 나타나거나 지속될 경우 의사와 반드시 상담해야 한다.
- 11) 이 약은 운전 및 기계 사용 능력에 영향을 미치지 않는다.
- 12) 이 약의 알려진 약물 상호작용은 없다. 그러나 예방조치로서 이 약을 적용한 환부(질한 부위)에 다른 의약품용 적용하지 않는 것이 권장된다.
- 13) 과량투여시의 처치 :
국소적 테르비나핀의 낮은 전신 흡수로 인해 과량투여 될 가능성이 극히 희박하다.
실수로 경구 복용한 경우, 이 약의 알코올 함유량을 고려하여야 한다.
실수로 이 약의 많은 양을 경구 복용했을 때의 이상반응은 테르비나핀 정제의 과량투여시 관찰되는 이상반응(두통, 오심, 명치 통증, 어지러움 등)과 유사할 것으로 예상되며, 추가적인 관리는 임상적 증상에 따른다.

5. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 열리지 말 것

【포장단위】 1병/상자(30mL/병)

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 정해진 용법 · 용량을 준수하여 사용할 것.
2. 잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
3. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
4. 스프레이 작동 시 한번에 끝까지 꼭 눌러서 사용할 것.
5. 사용도중 연속분사가 안될 시에는 잠시 후 사용할 것.
6. 사용 후 스프레이 끝부분을 휴지(또는 위생타월)로 깨끗이 닦아 보관할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2026. 01. 07

제조의뢰자:

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14

(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조사: (주)제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

무조날외용액_112100255_018



Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서	■	군청		
Material fix	모조지 (70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	120X260				
Date(Y/M/D)	2026/03/24				
Country	대한민국				

Memo

용법용량 수정
사용상의 주의사항 수정

※오버프린팅없음!!
※PDF파일로 인쇄교정정보를 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.