

코푸스탑 플러스

연질캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

유효성분 :

구아이페네신 (KP)	75mg
노스카핀염산염수화물 (KP)	20mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 (USP).....	15mg
트리메토클로놀염산염수화물 (KP)	2mg
d-클로르페니라민말레산염 (KP)	2mg

첨가제(타르색소) :

황색5호

기타 첨가제 :

소르비톨소르비탄옥텟, 정제수, 젤라틴, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜600, 프로필렌글리콜

【성상】

무색 내지 주황색의 점조성액이 들어있는 주황색의 투명한 타원형 연질캡슐제

【효능 · 효과】

기침, 가래

【용법 · 용량】

성인 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 만 3개월 미만의 영아
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멸미약, 알레르기용약), 진정제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름 (지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 소아에 대한 투여
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

10캡슐/상자(10캡슐/PTPX1)

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

- ※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)
- ※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼갈 것.
3. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.
4. 간혹 흰색 침전물이 보일 수 있으나 이는 원료에서 기인한 것으로 품질에는 이상이 없습니다.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2026. 03. 09

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 만서구 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

코푸스탑플러스연질캡슐_112100305_016



Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서		군청		
Material fix	모조지 (70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	120X260				
Date(Y/M/D)	2026/04/29				
Country	대한민국				

Memo

기타 첨가제 수정
주소 수정

※오버프린팅없음!!
※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.