Original 장내 유익균 정장제

메디락에스® 장용 캡슐

5억생균

일반의약품

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

유효성분 :

엔테로코쿠스페슘균(별규) ····· 5.063mg (생균수로서 엔테로코쿠스페슘 $4.5x10^8$)

바실루스서브틸리스균(별규) ····· 0.563mg (생균수로서 바실루스서브틸리스 $0.5x10^8$)

첨가제(동물유래성분) : 유당(소, 우유), 유당수화물(소, 우유)

기타 첨가제 : 농글리세린, 디아세틸화모노글리세리드, 아스코르브산, 유청분말, 캡슐, 탤크, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스프탈레이트

【성 상】 흰색~밝은 노란색의 가루가 함유된 상, 하 흰색의 장용성 경질캡슐제

【효능 · 효과】 정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

【용법 · 용량】 성인 및 12세 이상: 1회 1~2캡슐, 1일 1~3회 경구복용

【사용법】

※ 본 제품은 제품의 인습 방지 및 변색 예방을 위해 방습 원단이 사용되었으며, 제제 특성상 캡슐이 깨질 수 있으니 PTP 개봉 시 주의하여 사용하시기 바랍니다.



① 손톱 등으로 알루미늄을 벗겨내고, 캡슐을 꺼내 섭취하시기 바랍니다.



② 캡슐은 포켓의 중앙부에 위치하고 있으니, 한쪽 끝을 눌러 섭취하시기 바랍니다.

【복용법】





※ 물없이 복용하실 경우 드물게 캡슐이 깨질 수 있으며, 이때 발생한 캡슐 파편으로 인해 식도 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 충분한 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

【사용상의 주의사항】

1. **다음 환자에는 투여하지 말 것.**
   이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**
   의사의 치료를 받고 있는 환자
3. **다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.**
   1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. **기타 이 약의 복용시 주의할 사항**
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
   2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
5. **저장상의 주의사항**
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
   2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
   3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】

100캡슐/상자(10캡슐/PTPx10), 300캡슐/병

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 이 제품은 캡슐이 장용코팅되어 있으므로 캡슐을 제거하면 장내 유익균 역가가 저하될 수 있으니 캡슐째로 복용할 것.
3. PTP 포장일 경우 : 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 장용캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 장용캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.
4. 병 포장일 경우 : 개봉 후 충진물이 있을 경우, 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것. (실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)
5. 냉장보관 하는 것이 더욱 좋음.

※ 이 제품은 위산에 파괴되지 않도록 제조된 특수제형이므로 아주 드물게 구토 혹은 극심한 설사 시 제형 그대로 배출될 수도 있습니다.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품내에 갈색 또는 회갈색의 입자가 있는 경우가 있으나
이는 장내 유익균체로 제품의 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드십시오 ※

설명서 개정연월일 : 2025. 06. 02

Hanmi 한미약품(주)
(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고,
설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 **변경된 내용**은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

4791
Ver.00026016

메디락S장용캡슐_112100026_016

Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서		군청		
Material fix	모조지 (70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	210X150				
Date(Y/M/D)	2025/06/13				
Country	대한민국				

Memo

용법용량 수정

※오버프린팅없음!!
※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.