

코감기가 싹 코앰쿨[®]S에스 나잘스프레이

일반의약품

【원료약품의 분량】 이 약 1mL 중

유효성분 : 옥시메타졸린염산염(USP)	0.5mg
클로르페니라민말레산염(USP)	2.5mg
글리시리진산이칼륨(KP)	3.0mg
첨가제(보존제) : 메틸파라벤	0.9mg
프로필파라벤	0.1mg
기타 첨가제 : 맥스판테롤, 유칼립투스, 정제수, 폴리스orbey트80, 프로필렌글리콜, L-멘톨	

【성 상】

일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명한 액제

【효능·효과】

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

【용법·용량】


만 7세 이상 및 성인에게 1일 1~2회, 1회 1~2번씩 각 비강에 분무한다.

적용간격은 10~12시간으로 하고 24시간 동안 2회를 초과하지 않는다.

【코앰쿨에스나잘스프레이 사용방법】


- 

1. 사용 전에 용기를 잘 흔들어 준 후 스톱퍼(안전핀)를 빼고 ②번 화살표 방향으로 뚜껑을 엽니다.

❗ 스톱퍼(안전핀)를 빼지 않으면 분사가 되지 않습니다.
- 

2. 코를 풀어 콧 속을 깨끗이 한 후 약액이 잘 분사되는지 확인하기 위해 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 눌러주어 액이 균일하게 분사되는지 확인합니다.
- 

3. 왼쪽 코에 분사할 땐 오른손으로 제품을 쥐고 비중격(코안을 좌우로 나누는 칸막이) 벽에 분사되지 않도록 분사구가 바깥쪽을 향하게 넣어 1회 분사해 주세요. 이 때, 왼손으로 반대편 코를 막고 고개를 살짝 숙어주세요(오른쪽 코 분사는 이와 반대).

※ 그림2와 같이 화살표 방향으로 검지와 중지로 분사기를 누르면 분사가 됩니다. 내용물 분사 시 용기를 바로 세워서 사용하세요.
- 

4. 콧 속에 분사 후에는 코로 숨을 가볍게 들이마신 다음, 입으로 숨을 내뿜습니다.
- 

5. 사용 후에는 분사구를 깨끗이 닦아주고 스톱퍼(안전핀)를 꽂고 뚜껑을 닫습니다.

※ 분사구가 얇아 어린이들이 사용하기에 편리합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 만 7세 미만의 어린이
 - 만 2세 미만의 영아
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약(비염용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진·발적, 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 다음과 같은 기침이 있는 사람
 - 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적, 부종, 자극감, 가려움
 - 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
 - 3) 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
 - 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
 - 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
 - 6) 사용하는 동안 줄음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작에 주의할 것.
 - 7) 사용 시에는 음주하지 말 것.
 - 8) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 1병(30mL)/상자

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 먹지 말 것. 눈, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
3. 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.
4. 사용 후 입구 쪽을 깨끗이 닦아 보관할 것.
5. 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
6. 7일 이상 연속으로 사용하지 말 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2025. 03. 17

제조의뢰자 :

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14

(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

제조사 : (주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 47

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

코앤쿨에스나잘스프레이_002

Hanmi

Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서	군청			
Material fix	모조지 (70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	120X230				
Date(Y/M/D)	2025/04/04				
Country	대한민국				

Memo

용법용량 수정

※오버프린팅없음!!

※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.