

제텐·씨[®]정

【원료약품의 분량】1정 중

유효성분

티아민질산염(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	20mg
시아노코발라민1000배산(KP)	12mg
(시아노코발라민으로서 12μg)	
제피아스코르브산(별규)	781.25mg(아스코르브산으로서 750mg)
토코페롤아세테이트2배산(KP)	60mg
(비타민E로서 30IU)	
판토텐산칼슘(KP)	20mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
폴산(KP)	400μg
황산아연수화물(EP)	61.76mg

첨가제(타르색소)

청색1호 알루미늄레이크, 황색4호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분)

스테아르산마그네슘(소, tallow oil)

기타 첨가제

디아세틸화모노글리세리드, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 에틸바닐린, 크로스카멜로오스나트륨, 콜로이드성이산화규소, 폴리메틸렌글리콜6000, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성 상】

녹색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 (B₁, B₂, B₆, C, E)의 보급
 - 육체피로
 - 임신/수유기
 - 병중/병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방
- 아연의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정씩 식후 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 심장, 순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 8) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - ① 비타민E 함유제제: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적
 - ② 비타민C 함유제제: 구역, 구토, 설사
 - ③ 비타민B₆ 함유제제: 구역, 구토, 묽은 변
 - ④ 아연 함유제제: 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종, 구토

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 일어날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 할 것
 - 10) 우발적으로 과량복용한 경우
 - 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것
 - 2) 각종 요 검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전/후에는 피할 것
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】

차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】

1병/상자(60정/병)

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

- ※ 부작용 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원 (14-3330)
- ※ 의약품 부작용 신고 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질・변패・오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것.
(실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를
입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2024. 04. 15

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품 정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.