

목앤[®] 스프레이

“목이 아프신가요?”

【원료약품의 분량】1mL 중

유효성분 : 수용성아줄렌(KP) 0.2mg
 세틸피리디늄염화물수화물(USP) 3mg
 기타 첨가제 : 농글리세린, 박하향NPF-2674, 수크랄로스, 시트르산, 에탄올(95), 유칼립투스, 인산수소나트륨수화물, 정제수, 프로필렌글리콜, L-멘톨

【성 상】 일정량씩 분무되는 용기에 든 보라색의 투명한 액제

【효능·효과】

목(인후)의 염증으로 인한 목의 통증, 목의 부종(부기), 목의 불쾌감, 목이 쉼, 구내염(입안염)

【용법·용량】

1일 수회 적당량을 환부에 분사 도포(바르다)한다. 목의 염증에 사용하는 경우 용기의 분사구가 목의 환부를 향하게 하고 가볍게 숨을 내쉬면서 1회 3~4번 분사하고, 1일 3~5회 사용한다.

【사용방법】



1. 제품의 회전식 안전클립을 그림과 같이 돌려 화살표를 노즐방향에 맞춘다.

! 안전클립의 화살표방향과 노즐방향을 맞추지 않으면 분사가 되지 않습니다.



2. 스프레이 상단을 가볍게 3~4회 눌러 목의 통증이 있는 부위 가까이에 분사 한다.
 내용물 분사 시 용기를 바로 세워서 사용하세요.



3. 제품 사용후에는 내용물이 흘러 나오지 않도록 안전클립의 화살표를 그림과 같이 노즐 반대방향으로 돌려 잘 보관한다.

【사용상의 주의사항】

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽고 사용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 2) 구강(입안)내 짓무름이 심한 사람
 - 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 4) 약물에 대하여 알레르기 병력이 있는 사람
 - 5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 사용 후 다음 증상이 있는 경우 : 입에 자극감, 피부에 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 위부 불쾌감, 메스꺼움
 - 2) 증상이 악화되는 경우
 - 3) 5~6일을 사용하였으나 증상의 개선이 없는 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지켜서 사용한다.
- 2) 처음 사용하는 경우 약액이 나올 때까지 4~5회 분사 후 사용한다.
- 3) 호흡을 들이마실 때 이 약을 사용하면 약액이 기관지 또는 폐로 들어갈 수 있으므로, 용기 분사구를 목의 환부로 향하게 하고 '아'하고 목소리를 내면서(가볍게 숨을 내쉬면서) 분사한다.
- 4) 목(인후(목구멍))의 도포(바르다)용으로 사용하고, 내복(먹지)하지 않는다.
- 5) 소아가 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래 사용한다.
- 6) 약액이 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우 즉시 물로 잘 씻고, 바로 안과전문의에게 진료를 받는다.
- 7) 이 약을 사용하고 일정시간 내에는 음주운전 판정 농도 이상의 알코올이 호흡으로 검출될 수 있으므로, 운전 중의 사용은 피한다.
- 8) 장기연용하지 않는다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 서늘한 장소에 뚜껑을 닫아 보관한다.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- 4) 약액이 의류 등에 묻은 경우에는 즉시 물 또는 세제로 씻는다.
- 5) 사용시 약액의 분출이 달라질 수 있으므로 용기 노즐(분사구)의 입구 부분을 바늘 등으로 뚫지 않는다.
- 6) 화기와 가깝게 두지 않는다.
- 7) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 1병/상자(20mL/병)

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 고온에 노출 될 경우 제품 특성상 누액이 생길 수 있습니다.

※ 제품을 거꾸로 보관 시 제품에 누액이 생길 수 있습니다.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 먹지 말 것. 눈, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
3. 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.
4. 사용 후 입구쪽을 깨끗이 닦아 보관할 것.
5. 고온(60도 이상)에 노출시 누액이 발생할 수 있으니 보관조건을 준수할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에
상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2026. 04. 17

제조의뢰자:

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14

(공장) 경기도 화성시 만석구 팔탄면 무하로 214

제조사: (주)제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

목앤스프레이_112101985_012

Hanmi

Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서		군청		
Material fix	모조지 (70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	120X270				
Date(Y/M/D)	2026/04/22				
Country	대한민국				

Memo

주소 변경

※오버프린팅없음!!
※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.