

코감기가 싹

코앰쿨[®] 나잘 스프레이

일반의약품



음성·수어정보 제공

【원료약품의 분량】이 약 100mL 중

유효성분 : 자일로메타졸린염산염(EF) 100mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 250mg
 첨가제(보존제) : 벤질글꼴염화물 10mg
 기타 첨가제 : 수크랄로스, 에데트산나트륨수화물, 염화나트륨, 유칼립투스, 인산수소나트륨수화물, 인산이수소나트륨수화물, 정제수, 폴리옥실40 경화피마자유, D-스orbitol, L-멘톨

【성 상】

일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명한 액제

【효능·효과】

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

【용법·용량】


만 12세 이상 및 성인에게 1일 1~3회, 1회 1번씩 각 비강에 분무한다.
 연령 및 증상에 따라 적절히 증감하되 1일 3회 초과하지 않고, 매회 최소 8시간 이상의 간격을 두고 적용한다.

【코앰쿨나잘스프레이 사용방법】



1. 사용 전에 용기를 잘 흔들어 준 후 스토퍼(안전핀)를 빼고 ②번 화살표 방향으로 뚜껑을 엽니다.

① 스토퍼(안전핀)를 빼지 않으면 분사가 되지 않습니다.



2. 코를 풀어 콧 속을 깨끗이 한 후 약액이 잘 분사되도록 확인하기 위해 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 눌러주어 액이 균일하게 분사되는지 확인 합니다.




3. 왼쪽 코에 분사 할 때 오른손으로 제품을 쥐고 비강측(코안을 좌우로 나누는 칸막이 벽)에 분사되지 않도록 분사구가 바깥벽을 향하게 넣어 1회 분사해 주세요. 이 때, 왼손으로 반대편 코를 막고 고개를 살짝 숙여주세요(오른쪽 코 분사는 이와 반대).

※ 그림2와 같이 화살표 방향으로 검지와 중지로 분사기를 누르면 분사가 됩니다. 내용물 분사 시 용기를 바로 세워서 사용하세요.



4. 콧 속에 분사 후에는 코로 숨을 가볍게 들이마신 다음, 입으로 내뿜습니다.



5. 사용 후에는 분사구를 깨끗이 닦아주고 스토퍼(안전핀)를 꽂고 뚜껑을 닫습니다.

※ 분사구가 얇아 어린이들이 사용 하기에 편리 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 만 12세 미만의 어린이
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)¹⁾

¹⁾ 디펜히드라민 및 그 염류 함유제제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진·발적, 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알 수 없으므로, 이 약은 의사, 치과 의사, 약사의 지시·감독 하에 사용해야 한다.
 - 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 다음과 같은 기침이 있는 사람
 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진·발적, 부종, 자극감, 가려움
 - 3일간 사용하더라도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
- 3) 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
- 6) 사용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작에 주의할 것.
- 7) 사용 시에는 음주하지 말 것.
- 8) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.
- 9) 이 약은 벤질코늄염화물을 함유하고 있어, 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장기간 사용 시 비강 내 자극이나 종창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**【포장단위】** 1병(20mL)/카톤**【제품문의처】**

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)

※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 먹지 말 것. 눈, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
3. 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.
4. 사용 후 입구쪽을 깨끗이 닦아 보관할 것.
5. 고온(60도 이상)에 노출시 누액이 발생할 수 있으니 보관조건을 준수할 것.
6. 7일 이상 연속으로 사용하지 마세요.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2025. 12. 05

제조원리자 :

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14

(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조사 : (주)파슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 47

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

코앤콜나잘스프레이_003



Data info		Color info	Printing info	
Type	설명서	군청		
Material	모조지 (70g)			
Coating				
Size(LxWxH/mm)	150X190			
Date(Y/M/D)	2025/12/05			
Country	대한민국			

Memo

수탁사 설비변경에 따른 규격 변경

※ 오버프린팅없음!!

※ PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.